Nota sobre el genero **Papilio** en la República Argentina

POR FEDERICO NOSSWITZ

El más conocido entre los papilios argentinos, es el *P. thoas thoantiades*, bastante común, buen volador y no muy arisco; se le caza con facilidad, vuela todo el verano. Grupo *thoas*.

Papilio lamarchei, del norte de la República, hay en Tucumán, no es muy común, los ejemplares de mi colección son del señor Schreiter, Tucumán. Pertenece al Grupo torquatus.

Al mismo grupo pertenece el *Papilio lycophron*. Este Papilio lo he cazado mucho en la Isla Martín García, es bastante común, vuela en dos generaciones, en noviembre y en febrero y marzo. Los macho son bastante variables en las alas de abajo, hay ejemplares con franja negra ancha, y con faja estrecha. En la Colección Niepelt, Zirlau, Alemania, existen ejemplares machos, con fajas en las alas de abajo completamente negras. Este *Papilio* tiene dos hembras diferentes, *pirithous* común en la Isla de Martín García, y *oebalus* gris claro, en Misiones.

Papilio hellanichus, tiene dos generaciones, en noviembre y en febrero y marzo, bastante raro, pertenece al grupo de *scamander*, lo mismo como el *Papilio argentinus* Joergensen, este Papilio es muy raro, se conoce solamente en la República Argentina al norte de Tucumán, el señor Schreiter encontró las crisálidas muy escondidas en las ranuras de la corteza de los árboles, son muy difíciles de encontrar. Sitio: Falda del Aconquija.

Al Grupo de los thoas, pertenece aún el *Papilio androgueus*, algo parecido al *thoas*, tiene dos hembras muy diferentes,*laodocus*, al norte de la República Argentina, y *piranthus* en las fuentes de Paraná, Goya, etc.

Papilio polydamas; es un papilio negro con una cinta de lunetas amarillas cerca del borde de las alas, alrededor de Buenos Aires es bastante raro, muy volador y arisco, es muy difícil de cazar. En Tucumán es muy común, en tal abundancia que se le puede cazar con la mano.

Papilio duponcheli, raro en Buenos Aires, falta en la Isla Martín García, antes había gran abundancia de este *Papilio* hoy casi desaparecido.

Papilio corethrus. Hoy desaparecido del todo por falta de la planta de mantención de la oruga, los dos pertenecen al Grupo de ***Euryades.***

Papilio damokrates, vuela casi todo el verano, en los últimos años casi escaso, tiene alrededor de las alas, un canto blanco, las alas de abajo con pequeños ángulos rosa pálido, pertenecen al Grupo *ascanius.*

Alrededor de Tucumán existe el *Papilio erlaces,* no es muy raro, macho y hembra son diferentes, pertenecen al Grupo *aeneas.*

Papilio capys. Muy escaso alrededor de Buenos Aires, lo cacé dos veces en la Isla Martín García. Grupo *anchisiades.*

Papilio perrhebus, un ejemplar de Misiones del señor Bosq.

Papilio stenodesmus, vive en Misiones, pero no tengo ejemplares. Argentinos. Grupo *protesilaus.*